


Classification de NASSAR de l'échelle de difficulté des cholécystectomies laparoscopiques .

<u>GRADE</u>	<u>Aspect per-opératoire</u>	<u>Exemple</u>
<u>GRADE 1</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vésicule biliaire : lâche, non adhérente. • Pédicule cystique : fin et clair. • Adhérences : simples jusqu'au col ou à la poche de Hartmann. 	
<u>GRADE 2</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vésicule biliaire : mucocèle, remplie de calculs. • Pédicule cystique : grasseux. • Adhérences : simples jusqu'au corp. 	
<u>GRADE 3</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vésicule biliaire : enchâssée, cholécystite aiguë, scléro-atrophique, fibrose, poche de Hartmann adhérente au cholédoque, calcul enclavé • Pédicule cystique : anatomie anormale ou canal cystique court, dilaté ou caché. • Adhérences : denses jusqu'au fundus ; impliquant l'angle colique ou le duodénum 	
<u>GRADE 4</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Vésicule biliaire : complètement cachée, empyème, gangrène, masse • Pédicule cystique : impossible à identifier. • Adhérences : denses, fibrose, couvrant la vésicule biliaire ; duodénum ou angle colique droit difficile à cliver. 	